

# PERGUNTAS FREQUENTES



## **GESTANTES, LACTANTES OU PUÉRPERAS (FASE PÓS-PARTO) PODERÃO TOMAR A VACINA?**

**A SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS NÃO FORAM AVALIADAS NESSES GRUPOS, MAS ESTUDOS EM ANIMAIS NÃO DEMONSTRARAM RISCO DE MALFORMAÇÕES.**

**PARA AS MULHERES PERTENCENTES AO GRUPO DE RISCO, A VACINAÇÃO PODERÁ SER REALIZADA APÓS AVALIAÇÃO CAUTELOSA DOS RISCOS E BENEFÍCIOS E COM DECISÃO COMPARTILHADA ENTRE ELA E O SEU MÉDICO PRESCRITOR.**

**PARA AQUELAS QUE FOREM VACINADAS INADVERTIDAMENTE, CABE AO PROFISSIONAL TRANQUILIZÁ-LAS SOBRE A BAIXA PROBABILIDADE DE RISCO E ENCAMINHAR PARA O ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL.**

**OBS.: AS VACINAS PARA GESTANTES, LACTANTE E PUÉRPERAS (MULHER QUE DEU À LUZ HÁ BEM POUCO TEMPO) ESTÁ SENDO REALIZADA DESDE QUE A PESSOA A SER IMUNIZADA COMPAREÇA PORTANDO UM ATESTADO MÉDICO INDICANDO E LIBERANDO A VACINAÇÃO.**



## **A VACINA É RECOMENDADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES?**


**OS TESTES CLÍNICOS DAS DUAS VACINAS APROVADAS ATÉ AGORA PELA ANVISA NÃO CONTEMPLARAM MENORES DE 18 ANOS.**

**POR ISSO, ENQUANTO NÃO HOVER ESTUDOS MAIS COMPLETOS QUE INCLUAM ESSA POPULAÇÃO, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO ESTÃO NO PÚBLICO-ALVO QUE SERÁ IMUNIZADO. APÓS OS RESULTADOS DOS ESTUDOS CLÍNICOS DA FASE III, ESSAS ORIENTAÇÕES PODEM SER REVISTAS.**



## **FAÇO USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, HÁ ALGUMA CONTRAINDICAÇÃO PARA TOMAR A VACINA?**

**A VACINA SOMENTE É CONTRAINDICADA ÀS PESSOAS QUE TÊM HIPERSENSIBILIDADE AO PRINCÍPIO ATIVO OU A QUALQUER UM DOS SEUS COMPONENTES, ALÉM DAQUELAS QUE JÁ APRESENTARAM UMA REAÇÃO ALÉRGICA INTENSA CONFIRMADA AO TOMAR UMA DOSE ANTERIOR DE UMA VACINA CONTRA A COVID-19.**



# PERGUNTAS FREQUENTES

## **QUEM JÁ TEVE COVID-19 PODE SE VACINAR?**

**PODE. NÃO HÁ EVIDÊNCIAS, ATÉ O MOMENTO, DE QUALQUER RISCO COM A VACINAÇÃO DE INDIVÍDUOS COM HISTÓRICO ANTERIOR DE INFECÇÃO OU COM ANTICORPO DETECTÁVEL PARA SARS-COV-2.**

**ALÉM DISSO, COMO HÁ CASOS DE REINFECÇÃO E MESMO NOVAS VARIANTES DO VÍRUS CIRCULANDO, AINDA NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS DE QUE QUEM PEGOU A DOENÇA JÁ ESTEJA AUTOMATICAMENTE IMUNIZADO.**

## **TENHO SINTOMAS DE COVID-19, POSSO ME VACINAR?**

**É MELHOR ESPERAR. DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, É IMPROVÁVEL QUE A VACINAÇÃO DE INDIVÍDUOS INFECTADOS, EM PERÍODO DE INCUBAÇÃO, OU ASSINTOMÁTICOS TENHA UM EFEITO PREJUDICIAL SOBRE A DOENÇA.**

**PORÉM, RECOMENDA-SE O ADIAMENTO DA VACINAÇÃO NAS PESSOAS COM QUADRO SUGESTIVO DE INFECÇÃO, PARA SE EVITAR CONFUSÃO COM OUTROS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS. COMO A PIORA CLÍNICA PODE OCORRER ATÉ DUAS SEMANAS APÓS A INFECÇÃO, A VACINAÇÃO DEVE SER ADIADA ATÉ A RECUPERAÇÃO CLÍNICA TOTAL E PELO MENOS QUATRO SEMANAS APÓS O INÍCIO DOS SINTOMAS OU QUATRO SEMANAS A PARTIR DA PRIMEIRA AMOSTRA DE PCR POSITIVA EM PESSOAS ASSINTOMÁTICAS.**


## **TODO MUNDO É OBRIGADO A SE VACINAR?**

**A VACINAÇÃO É UM PACTO COLETIVO, QUE HÁ DÉCADAS TÊM SALVADO MILHÕES DE PESSOAS DE SEREM CONTAGIADAS E MORREREM POR DOENÇAS VIRAIS. ISSO SIGNIFICA QUE QUANTO MAIS PESSOAS TOMAREM A VACINA, MENOS O VÍRUS CIRCULA NO AMBIENTE, EVITANDO QUE AQUELAS QUE POR ALGUM MOTIVO NÃO PODEM SER VACINADAS SEJAM CONTAMINADAS. POR ISSO, QUANTO MAIS PESSOAS SE IMUNIZAREM, MAIS FÁCIL SERÁ DE CONTER A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS.**

**O PNI ESTABELECEU COMO META VACINAR AO MENOS 90% DA POPULAÇÃO ALVO DE CADA GRUPO, UMA VEZ QUE É DE SE ESPERAR QUE UMA PEQUENA PARCELA DA POPULAÇÃO APRESENTE CONTRA INDICAÇÕES À VACINAÇÃO.**

## **POSSO BEBER BEBIDAS ALCOÓLICAS APÓS A VACINAÇÃO?**

**AO PASSO QUE A VACINA É RECENTE EM ESTUDO, NADA SE REFERE AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, NO ENTANTO UMA RECOMENDAÇÃO SEGURA SERIA A DE NÃO INGERIR BEBIDAS ALCOOLICAS 24 HORAS ANTES E 24 HORAS APÓS A VACINAÇÃO**



# PERGUNTAS FREQUENTES

## **POR QUE MESMO APÓS TOMAR A VACINA AINDA PRECISO USAR MÁSCARA?**

**MESMO COM O INÍCIO DA IMUNIZAÇÃO, AINDA NÃO É HORA DE RELAXAR COM AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO.**

**USAR MÁSCARA, LAVAR AS MÃOS E MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL SÃO MEDIDAS EFICIENTES E NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.**

**ALÉM DISSO, AINDA FALTAM MUITOS MESES PARA QUE TODOS SEJAM VACINADOS CONTRA A COVID-19, E MESMO QUEM JÁ RECEBEU O IMUNIZANTE AINDA PODE CONTINUAR SENDO UM AGENTE DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA.**

## **QUANTO TEMPO APÓS A VACINAÇÃO ESTAREI IMUNIZADO?**

**NOS ESTUDOS REALIZADOS FOI OBSERVADO QUE APÓS 14 DIAS DA APLICAÇÃO DA SEGUNDA DOSE DA VACINA HÁ SORO CONVERSÃO PARA IMUNIDADE.**

**PORÉM, HÁ A NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE O TEMPO DE IMUNIDADE POR PARTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**

## **A VACINA TEM EFEITOS COLATERAIS OU TRAZ ALGUM RISCO?**

**TANTO NOS TESTES CLÍNICOS, COMO ENTRE OS PRIMEIROS VACINADOS, NÃO FORAM APRESENTADAS OCORRÊNCIAS GRAVES RELACIONADAS À VACINA. É IMPORTANTE LEMBRAR QUE OS ESTUDOS FORAM ANALISADOS PELA ANVISA E ACOMPANHADOS POR OUTRAS AGÊNCIAS MUNDIAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTÃO ATENTAS A QUALQUER INCIDENTE.**

**EM UMA SITUAÇÃO EMERGENCIAL COMO A ATUAL PANDEMIA, QUE JÁ CONTAMINOU MAIS DE 96 MILHÕES E MATOU 2 MILHÕES DE PESSOAS EM TODO O MUNDO, AS VACINAS ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS DE FORMA ACELERADA, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO.**

**ALÉM DISSO, COMO ELAS SERÃO ADMINISTRADAS EM MILHÕES DE INDIVÍDUOS, É DE SE ESPERAR A OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV). ESSAS SITUAÇÕES DEVERÃO SER NOTIFICADAS COMPULSORIAMENTE PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.**

